.:;, ::|:: :.; ..: klitorik°trnsprnt

.:;, ::|:: :.; ..: klitorik°trnsprnt schwitzt in berlin im sommer 008+
www.klitorik.com :*: mail[a]klitorik.com ~

this issue are //
alexander binder from stuttgart ~ www.alexanderbinder.de
fabian grimme from berlin ~ www.kopoba.de
annika mahler from lubmin
gundula beduhn from vienna
oliver thomas, marius rehmet & steven thomas from berlin

dedicated to our friends ~*

+



Blut

Sehr selten kann es zu Störungen der Blutbildung kommen (Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie, Panzytopenie, Agranulozytose). Erste Anzeichen können sein: Fieber, Halsschmerzen, oberflächliche Wunden im Mund, grippeartige Beschwerden, starke Abgeschlagenheit, Nasenbluten und Hautblutungen. In diesen Fällen ist das Arzneimittel sofort abzusetzen und der Arzt aufzusuchen. Jegliche Selbstbehandlung (z. B. Schmerz- oder fiebersenkenden Arzneimitteln, sollte

Sehr selten kann es zu Entzündungen der Speiseröhre sowie zur Ausbildung von membranartigen Verengungen in Dünn- und Dickdarm kommen.

Filmtablette enthält 600 mg Ibuprofen

Die sonstigen Bestandteile sind

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Mund- und Rachenentzündungen

Bei Überempfindlichkeit gegenüber Parabenen (Hilfsstoffe) kann eine Kreuzallergie

Alter	Einzeldosis	Tagesgesamtdosis
Jugendliche ab 15 Jahren	1 Filmtablette (entsprechend 300 mg Ibuprofen)	2-4 Filmtabletten (entsprechend 1200-2400 mg Ibuprofen)

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.


Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Musik Geschichte


FREUNDE?
HOCHNÄSIG
ERNST
Pause
My part
HALLO!
SALUT
Ich liebe diese Blümlein so wie dich, deshalb habe ich Sorge, dass sie meinen langen Tag nicht überleben ... So verweilen sie noch etwas bei dir in der Stube


Ustrzyki Dolne
Osiedle PCK
Dom wczasowy "Pod Dębami"
Dworzec kolejowy
Basen kąpielowy
fot.© A. Szczerbicki
Barcelona ist schon
ich bin am meer
war nen guter
kannst ja nochmal
nüchtern drüber
reden wenn du
willst
bist nen guter Freund?
Du stinkst!

berlin :*: summer 2008 ~